

# DESCRIPTIONS

DE QUELQUES

## Espèces nouvelles de la famille des COCCINELLIDÆ

Par M. HENRI GADEAU DE KERVILLE.

---

(Séance du 13 Juin 1883.)

---

### 1. CYRTOCARIA MOCQUERYSI Kerv.

(Pl. 4, fig. 6.)

*Hemisphærica*; pronoto rufo-pallente, medio nigro maculato, scutello nigro, clytris rufo-testaceis, maculis nigris 8 singulatim ornatis: 1<sup>a</sup> humerali, 2<sup>a</sup> juxta suturali, 3<sup>a</sup> juxta marginali, 4<sup>a</sup> et 5<sup>a</sup> punctiformibus, 6<sup>a</sup> submarginali, rotundata, 7<sup>a</sup> et 8<sup>a</sup> juxta suturalibus, hac apicali; corpore subtus pedibusque rufo-testaceis.

Long. 10 mill.; larg. 9 mill.

Corps hémisphérique, luisant. Tête, antennes et palpes d'un roux pâle. Pronotum concolore, présentant sur son tiers médiale une tache noire, subcarrée, n'atteignant pas complètement le bord antérieur. Écusson noir. Élytres rousses, parées de trois taches suturales communes et chacune de cinq autres taches noires: la première des taches suturales située vers le premier tiers, la seconde vers le deuxième et la dernière apicale, en forme de  $\tau$  renversé; la première des taches particulières ponctiforme, sur le calus, les deuxième, troisième et quatrième en rangée transversale vers le milieu de l'élytre, la plus externe de ces trois taches subcarrée,

marginale et plus grande que les deux autres qui sont punctiformes, la cinquième subarrondie, placée près du rebord et vers les deux tiers de l'élytre. Il existe également, sur chaque élytre, une très petite tache noire touchant à l'écusson. Repli marqué de brun noir à son extrémité postérieure et d'une tache concolore correspondant à la marginale. Dessous du corps et pattes d'un roux testacé.

Patrie : Madagascar. — Ma collection.

Je dédie cette espèce à mon regretté collègue, M. Simon Mocquerys, qui fut mon premier maître en entomologie.

OBSERV. Cette espèce est voisine de la *Cyrtocaria regalis* Oliv., dont elle se distingue facilement par la tache apicale de ses élytres et par son corps beaucoup moins convexe.

## 2. ITHONE (AIOLOGARIA) HEXASPILOTA Hope, var. NIGRA Kerv.

Cette variété se distingue de la forme typique par ses élytres entièrement noires. Crotch l'indique dans sa *Revision of Coccinellidæ* (p. 178) sans lui imposer de nom; cependant, vu son mode tout particulier de coloration, je crois devoir lui en donner un, bien que je sois opposé à la création de noms nouveaux pour désigner des variations de taches ou de coloris chez des insectes aussi variables que le sont les Coccinellides. J'ajouterai que je n'ai jamais observé d'intermédiaire entre le type et cette curieuse variété.

Patrie : Daourie. — Ma collection, etc.

## 3. NEDA BOURGEOISI Kerv.

(Pl. 4, fig. 7.)

*Suborbicularis, tectiformis; capite pronotique flavis, hoc reticulo medio H formâ limboque basali et marginali nigris, scutello nigro, elytris rufotestaceis cum limbo pallidiore, sutura margineque lata nigris; corpore subtus pedibusque nigris, tibiis ad apicem tarsisque dilutioribus.*

Long. 10 mill.; larg. 9 1/2 mill.

Corps suborbiculaire, en toit, luisant. Tête flave, avec une petite tache brune de chaque côté et en avant. Antennes et palpes roussâtres. Pronotum flave, paré en son milieu d'un réseau noir en forme d'H, n'atteignant pas le bord antérieur, d'une bordure basilaire large et d'une bordure latérale très étroite, noires. Écusson noir. Élytres roussâtres, entourées d'une bande plus pâle. Rebord marginal large, peu incliné, noir ainsi que la suture. Repli flave, largement bordé de noir. Dessous du corps et pattes noirs. Extrémité des tibias et tarses de couleur un peu plus claire.

Patrie : Australie. — Ma collection.

Je dédie cette belle espèce à mon savant collègue et ami, M. Jules Bourgeois, qui m'a souvent aidé dans mes travaux entomologiques.

#### 4. CHILOCORUS AUSTRALASIÆ Kerv.

(Pl. 4, fig. 8.)

*Hemisphæricus*; capite, antennis, palpis pronotoque pallide rufis, hoc cum maculis 3 basalibus fuscis obsoletis, scutello nigro vel fusco-nigro, elytris nigris, singulatim macula juxta basali pallide rufa ornatis; corpore subtus pedibusque rufo-testaceis.

Long. 5 à 5 1/2 mill.; larg. 4 1/2 à 5 mill.

Corps hémisphérique, luisant. Tête, antennes et palpes d'un roux pâle. Pronotum concolore, avec trois taches basilaires brunes à peine visibles, situées, l'une au-dessus de l'écusson, les deux autres de chaque côté. Écusson noir ou brun noir. Élytres noires, ornées d'une tache basilaire transversalement allongée, d'un roux pâle, à concavité postérieure entourant le calus qui est noir, et occupant les deux tiers externes de l'élytre. Repli noir, marqué de jaune roux en avant et en arrière. Dessous du corps et pattes d'un testacé roussâtre.

Patrie : Australie : Rockhampton, Moreton-Bay. — Ma collection.

OBSERV. La tache basilaire n'occupe, chez certains individus, que l'angle externe de l'élytre.

## 5. ORCUS QUADRIMACULATUS KERV.

(Pl. 4, fig. 9.)

*Convexus, cyaneo-nitidus, pronoto æneo-viridi; elytris singulatim maculis 2 aurantiacis: 1<sup>a</sup> humerali, 2<sup>a</sup> punctiformi, ad quadrantem posteriorem sita; abdomine rufo-luteo, segmentis primis æneo-nigris.*

Long. 5 mill.; larg. 4 mill.

Corps convexe, brillant. Tête d'un vert foncé à reflet bronzé. Antennes et palpes roux. Pronotum bleu verdâtre foncé. Écusson concolore. Élytres d'un bleu d'acier, chacune avec deux taches jaune orangé, la plus grande humérale, subarrondie et légèrement échancrée à son bord antéro-interne, l'autre ponctiforme, placée au milieu et vers les trois quarts de l'élytre. Repli marqué d'une tache jaune correspondant à l'humérale. Dessous du corps et pattes d'un noir bronzé. Abdomen jaune roux, avec les premiers segments d'un noir bronzé.

Patrie : Australie : Rockhampton. — Ma collection.

Cette espèce est voisine de l'*Orcus bilunulatus* Boisd., dont elle se distingue aisément par sa taille inférieure, son corps moins convexe et le nombre des taches de ses élytres.

